

Fenômenos Mecânicos

Lista de exercícios: Cinemática Unidimensional, Vetores e Cinemática Bidimensional

Instruções: Justifique os cálculos, apresente as equações utilizadas e destaque os resultados finais. Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$ quando necessário. Os cálculos podem ser feitos sem calculadora.

Parte I – Exercícios

Questão 1. Um ciclista desloca-se em linha reta com velocidade constante de 6 m/s . No instante $t = 0$, sua posição é $x_0 = 10 \text{ m}$.

- (a) Escreva a função horária $x(t)$.
- (b) Determine a posição após 5 s .
- (c) Em quanto tempo chega a $x = 70 \text{ m}$?
- (d) Determine o deslocamento e a distância percorrida nos primeiros 5 s .

Questão 2. Um automóvel move-se em linha reta com velocidade inicial 4 m/s e aceleração constante 2 m/s^2 . Considere $x_0 = 0$.

- (a) Escreva $x(t)$ e $v(t)$.
- (b) Determine a velocidade em $t = 3 \text{ s}$.
- (c) Calcule o deslocamento entre 0 e 3 s .
- (d) Determine a distância percorrida nesse intervalo.

Questão 3. Uma esfera é abandonada do repouso a uma altura de 45 m . Despreze a resistência do ar e considere a origem no solo, com sentido positivo para cima.

- (a) Escreva $y(t)$.
- (b) Determine o tempo de queda.
- (c) Determine a velocidade imediatamente antes do impacto.
- (d) Calcule a distância percorrida durante o último segundo da queda.

Questão 4. Dados $\mathbf{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ e $\mathbf{B} = -\hat{i} + 2\hat{j}$, determine:

- (a) $\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$;
- (b) $|\mathbf{R}|$;
- (c) $\mathbf{D} = \mathbf{A} - \mathbf{B}$ e $|\mathbf{D}|$;
- (d) faça um esboço dos vetores no plano cartesiano.

Questão 5. Uma força de módulo 10 N forma um ângulo de 37° com o eixo horizontal positivo. Use $\cos 37^\circ = 0,8$ e $\sin 37^\circ = 0,6$.

- (a) Determine as componentes da força.

- (b) Escreva-a em termos dos vetores unitários.
- (c) Determine o módulo de $\mathbf{C} = -6\hat{i} + 8\hat{j}$.

Questão 6. Uma pessoa caminha 6 m para leste e, em seguida, 8 m para norte. Adote leste como eixo x positivo e norte como eixo y positivo.

- (a) Represente o deslocamento total por um vetor.
- (b) Determine seu módulo.
- (c) Determine a distância total percorrida.

Questão 7. Um objeto é lançado horizontalmente com velocidade inicial de 10 m/s do alto de uma plataforma de 20 m. Considere a origem no solo, diretamente abaixo do lançamento.

- (a) Escreva $x(t)$ e $y(t)$.
- (b) Determine o tempo até o solo.
- (c) Calcule o alcance horizontal.
- (d) Determine as componentes da velocidade imediatamente antes do impacto.

Questão 8. Um projétil é lançado do solo com velocidade inicial de 20 m/s, a 30° da horizontal. Use $\sin 30^\circ = 1/2$ e $\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$.

- (a) Determine as componentes da velocidade inicial.
- (b) Escreva $x(t)$ e $y(t)$.
- (c) Determine o instante da altura máxima e essa altura.
- (d) Determine o tempo total de voo e o alcance.

Questão 9. Um projétil é lançado do solo com velocidade inicial $10\sqrt{2}$ m/s, a 45° da horizontal. Despreze a resistência do ar.

- (a) Determine as componentes da velocidade inicial.
- (b) Calcule o tempo total de voo e o alcance.
- (c) Determine o módulo da velocidade no ponto mais alto.
- (d) Explique por que a velocidade não é nula nesse ponto.

Questão 10. Uma estudante caminha 30 m para leste em 10 s e depois 40 m para norte em mais 10 s.

- (a) Determine o vetor deslocamento e seu módulo.
- (b) Determine a velocidade vetorial média.
- (c) Determine a rapidez média.
- (d) Explique a diferença entre rapidez média e módulo da velocidade vetorial média.

Parte II – Resoluções

Questão 1. MRU.

- (a) $x(t) = x_0 + vt$, portanto $x(t) = 10 + 6t$.
- (b) $x(5) = 10 + 6(5) = 40 \text{ m}$.
- (c) $70 = 10 + 6t$, logo $t = 10 \text{ s}$.
- (d) $\Delta x = 40 - 10 = 30 \text{ m}$. Como o movimento não muda de sentido, a distância também é 30 m .

Questão 2. MRUV.

- (a) $v(t) = 4 + 2t$ e $x(t) = 4t + t^2$.
- (b) $v(3) = 4 + 2(3) = 10 \text{ m/s}$.
- (c) $\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = 4(3) + \frac{1}{2}(2)(9) = 21 \text{ m}$.
- (d) Como a velocidade é positiva em todo o intervalo, a distância é 21 m .

Questão 3. Queda livre.

- (a) $y(t) = 45 - 5t^2$.
- (b) $0 = 45 - 5t^2$, então $t^2 = 9$ e $t = 3 \text{ s}$.
- (c) $v_y = -gt = -10(3) = -30 \text{ m/s}$ (para baixo).
- (d) $y(2) = 45 - 20 = 25 \text{ m}$ e $y(3) = 0$, logo no último segundo percorre 25 m .

Questão 4. Operações com vetores.

- (a) $\mathbf{R} = (3 - 1)\hat{i} + (4 + 2)\hat{j} = 2\hat{i} + 6\hat{j}$.
- (b) $|\mathbf{R}| = \sqrt{2^2 + 6^2} = 2\sqrt{10}$.
- (c) $\mathbf{D} = (3 + 1)\hat{i} + (4 - 2)\hat{j} = 4\hat{i} + 2\hat{j}$ e $|\mathbf{D}| = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$.
- (d) As extremidades de $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ são $(3, 4)$ e $(-1, 2)$; as de $\mathbf{R}$ e $\mathbf{D}$ são $(2, 6)$ e $(4, 2)$, respectivamente.

Questão 5. Componentes de vetores.

- (a) $F_x = 10(0,8) = 8 \text{ N}$ e $F_y = 10(0,6) = 6 \text{ N}$.
- (b) $\mathbf{F} = 8\hat{i} + 6\hat{j} \text{ N}$.
- (c) $|\mathbf{C}| = \sqrt{(-6)^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$.

Questão 6. Deslocamento e distância.

- (a) $\Delta \mathbf{r} = 6\hat{i} + 8\hat{j} \text{ m}$.
- (b) $|\Delta \mathbf{r}| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ m}$.

(c) A distância total é $6 + 8 = \boxed{14 \text{ m}}$.

Questão 7. Lançamento horizontal.

(a) $x(t) = 10t$ e $y(t) = 20 - 5t^2$.

(b) $0 = 20 - 5t^2$, portanto $t = 2 \text{ s}$.

(c) $x(2) = 10(2) = \boxed{20 \text{ m}}$.

(d) $v_x = 10 \text{ m/s}$ e $v_y = -gt = -20 \text{ m/s}$, logo $\mathbf{v} = 10\hat{i} - 20\hat{j} \text{ m/s}$.

Questão 8. Lançamento oblíquo a 30° .

(a) $v_{0x} = 20 \cos 30^\circ = \boxed{10\sqrt{3} \text{ m/s}}$ e $v_{0y} = 20 \sin 30^\circ = \boxed{10 \text{ m/s}}$.

(b) $x(t) = 10\sqrt{3}t$ e $y(t) = 10t - 5t^2$.

(c) No topo, $v_y = 10 - 10t = 0$, então $t_{\max} = 1 \text{ s}$; $y(1) = 10 - 5 = \boxed{5 \text{ m}}$.

(d) $y = 0$ implica $t = 0$ ou $t = 2 \text{ s}$; o tempo total é $\boxed{2 \text{ s}}$ e o alcance é $20\sqrt{3} \text{ m} \approx \boxed{35 \text{ m}}$.

Questão 9. Lançamento a 45° .

(a) $v_{0x} = v_{0y} = 10\sqrt{2}(\sqrt{2}/2) = \boxed{10 \text{ m/s}}$.

(b) $t = 2v_{0y}/g = \boxed{2 \text{ s}}$ e $R = v_{0x}t = \boxed{20 \text{ m}}$.

(c) No ponto mais alto, $v_y = 0$, mas $v_x = 10 \text{ m/s}$; portanto $|\mathbf{v}| = 10 \text{ m/s}$.

(d) A gravidade altera apenas a componente vertical; sem resistência do ar, a componente horizontal permanece constante.

Questão 10. Velocidade média vetorial e rapidez média.

(a) $\Delta \mathbf{r} = 30\hat{i} + 40\hat{j} \text{ m}$ e $|\Delta \mathbf{r}| = \sqrt{30^2 + 40^2} = \boxed{50 \text{ m}}$.

(b) Como $\Delta t = 20 \text{ s}$, $\mathbf{v}_m = \Delta \mathbf{r}/\Delta t = \boxed{1,5\hat{i} + 2\hat{j} \text{ m/s}}$, cujo módulo é $2,5 \text{ m/s}$.

(c) A distância é $30 + 40 = 70 \text{ m}$, então a rapidez média é $70/20 = \boxed{3,5 \text{ m/s}}$.

(d) A rapidez média usa a distância percorrida; a velocidade vetorial média usa o deslocamento. Aqui, $70 \text{ m} > 50 \text{ m}$, por isso a rapidez média é maior que o módulo da velocidade vetorial média.